


INSTRUCCIONES DE USO DE METOJECT® PEN





INSTRUCCIONES DE ADMINISTRACIÓN METOJECT® PLUMA PRECARGADA

1. Zonas de inyección




- Zonas de inyección: abdomen o parte superior de los muslos.

2. Desinfección




- Use la toallita impregnada con alcohol incluida dentro del envase para desinfectar la zona de inyección elegida.

3. Retirar el capuchón




- Retire el capuchón amarillo.

4. Coger un pliegue de piel




- Forme un pliegue en la piel apretando suavemente el área en el lugar de la inyección.
- Coloque la pluma perpendicular a la piel.

5. Posición




- Sin apretar el botón todavía, empuje la pluma precargada suavemente sobre la piel para desbloquear el botón de inyección.
- Sujete la pluma firmemente contra la piel durante el proceso de inyección.

6. Inyección



- Apriete el botón para iniciar la inyección.
- Oirá un clic que indica el inicio de la inyección.
- Espere 5 segundos hasta que se haya inyectado todo el líquido.

7. Retirar



- Tan pronto observe que no queda líquido en el interior de la pluma, suelte la piel y retire la pluma.
- La cubierta protectora se desplaza automáticamente sobre la aguja, bloqueándola.

INYECCIÓN


METOJECT® PLUMA PRECARGADA

PREPARACIÓN PARA LA INYECCIÓN

- ⦿ Esta guía de instrucciones **no sustituye al prospecto de información para el paciente.**
- ⦿ Por favor, **lea detenidamente el prospecto de Metoject®/Metoject® Pen antes de iniciar la inyección.**
- ⦿ Por favor, recuerde que esta se administra solamente **una vez por semana.**
- ⦿ **Lávese las manos** cuidadosamente **antes de la inyección.**

ZONAS DE INYECCIÓN

- ⦿ Parte superior del muslo.
- ⦿ Abdomen, salvo el área alrededor del ombligo.



- ⦿ Si una persona de su alrededor le administra la inyección, esta persona también puede usar la parte superior de la zona posterior del brazo, justo debajo del hombro.
- ⦿ Cambie el lugar de aplicación en cada inyección. Así se minimizará cualquier reacción en el lugar de la inyección.
- ⦿ Nunca ponga la inyección en zonas donde la piel esté magullada, sensible, enrojecida o dura, o donde tenga cicatrices o estrías. Si tiene psoriasis, no debe intentar inyectarse directamente en ninguna lesión o placa inflamada, roja, gruesa o escamosa.